

普拿疼

速效膜衣錠

Panadol ActiFast

吸收比一般普拿疼錠2倍快速✓

**作用**

普拿疼速效膜衣錠為白色膜衣錠，含有Acetaminophen (乙醯胺酚)，為一解熱鎮痛劑。普拿疼速效膜衣錠的主成分Acetaminophen (乙醯胺酚)在人體內吸收進入血液循環的速度比一般乙醯胺酚錠兩倍快速，因此能更快到達痛源。

**成分**

有效成分及含量：Acetaminophen (乙醯胺酚) 500mg。

其他成分(賦形劑)：Sodium bicarbonate, Microcrystalline cellulose, Starch pregelatinised, Opadry II White, Maize starch, Magnesium stearate, Povidone, Potassium sorbate, Carnauba wax.

**用途(適應症)**

發燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

**使用上注意事項**

- 有下列情形者，請勿使用：
  1. 曾因藥物或因本藥成分引起過敏的人。
  2. 正在服用其他含 Acetaminophen (Paracetamol) 的處方或非處方藥治療疼痛、發燒、感冒徵狀或幫助睡眠的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 12歲以下。
  2. 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。
  3. 現正服用 Metoclopramide或 Domperidone以治療頭暈及嘔吐、Cholestyramine以治療高膽固醇或 Warfarin等抗凝血劑的人。
  4. 有肝腎臟問題、體重過輕或營養不良、經常飲酒的人。您可能需要避免併用本藥或限制所服用之 Acetaminophen劑量。
  5. 有嚴重感染、嚴重營養不良、嚴重體重過輕或長期重度飲酒的人可能增加代謝性酸中毒的風險。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。考量以最小建議劑量、最短使用時間服用本藥。
- 其他使用上注意事項：
  1. 請閱讀並遵照仿單說明書指示。
  2. 本藥每錠含173毫克的鈉，需低鈉飲食的人不適用本藥。
  3. 需要時服用，且用藥時程越短越好。
  4. 須置於兒童眼界未及且接觸不到之處。為防止兒童誤食請妥善保管。避免陽光直射。
  5. 勿超過建議使用量，可能會對肝造成嚴重損傷。
  6. 本藥含 Acetaminophen，服用過量的 Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen超過4000毫克(8錠)會發生肝臟損害。
  7. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
  8. 本藥適合大多數人使用，有些人偶有過敏反應發生，如皮膚癢或噁氣也偶爾會發生，但停藥後副作用即會消失。在建議劑量下服用，罕有副作用發生。

## 用法用量

### 醫師藥師藥劑生指示藥品

|          |   |
|----------|---|
| 成人及12歲以上 | 發燒或疼痛時服用，每次1~2錠，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。<br>兩次間隔請勿短於4小時，每24小時內不可超過4次。<br>請勿超過建議劑量(4000毫克：8錠)。 |
| 12歲以下    | 請洽醫師診治。   |

## 警語

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

| 身體部位 | 副作用           |
|------|---------------|
| 皮膚   | 發疹、脫屑、發癢、發紅   |
| 消化器官 | 噁心、嘔吐、食慾不振    |
| 神經系統 | 頭暈、耳鳴         |
| 其他   | 口腔潰瘍、未預期創傷或出血 |

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  - 若有任何不適情況發生。
  - 曾有服用阿斯匹靈或其他非類固醇抗發炎藥品而出現呼吸困難，且服用本藥出現類似症狀的人。
  - 有過敏情形，例如：臉、唇舌及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。
  - 有代謝性酸中毒徵兆(包含：深且急促的呼吸困難、噁心嘔吐、食慾不振)。
  - 服用過量(每日超過4000毫克；8錠)，雖然沒有任何徵兆產生但有肝衰竭風險，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。若服用超過建議劑量：可撥打藥物防治諮詢中心之24小時諮詢服務專線 (02 2871 7121)。
  - 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

儲存條件 30℃ 以下。

· 衛署藥輸字第023761號

包裝 2~1000錠ALU-PVC鋁箔盒裝



適用藥害  
救濟制度

ALU-PET-PVC鋁箔盒裝 (本品使用兒童安全包裝，  
加厚鋁箔設計使兒童不易開啟，以防止誤食。)



兒童安全包裝

藥商 / 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司

地址 / 台北市忠孝西路一段66號24樓

諮詢專線: 0800-212259

製造廠 / GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

地址 / Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

分包裝廠 / Sterling Drug (Malaya) Sdn. Bhd.

地址 / Lot 89, Jalan Enggang, Ampang/Ulu Kelang Industrial Estate, 54200 Selangor, Malaysia

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. ©2018 GSK group of companies or its licensor.

